

オプション検査

採血基本セットや健康診断に、1項目～追加可能です

肝機能

各 220 円

AST・ALT・γGTP・総ビリルビン・アルブミン
総蛋白... など

脂質

各 220 円

中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール... など

血糖

220 円

空腹時血糖

HbA1c

550 円

過去1～2ヶ月間の「平均的な血糖値」

腎機能

各 220 円

BUN・クレアチニン・eGFR・尿酸
Na・K・Cl... など

その他

要問合せ

CRP・ALP・LDH... など



自 費 検 査

健康診断への追加
健診以外での、単独検査が可能です

基本採血 セット

5,000円

血球・肝機能・脂質・腎機能の基本採血
当院、健康診断の項目

胃がんABC検査

6,600円

ピロリ菌抗体検査と胃粘膜委縮マーカーを組合せ、
胃がんリスクを層別化する検査

ピロリ菌（便）

5,500円

便中のピロリ菌を調べる検査（要提出）
尿素呼気検査と同等の高い判定力がある

ピロリ菌（採血）

3,300円

血中のピロリ菌抗体を測定
過去・現在を含めた感染の有無がわかる

シフラ

3,300円

主に肺ガンのスクリーニング

PSA

3,300円

前立腺がんのスクリーニング

男性 腫瘍4種

8,800円

AFP（肝臓）・CEA（消化器系など）
CA19-9（膵臓や胆管など）PSA（前立腺）

女性 腫瘍5種

9,900円

AFP（肝臓）・CEA（消化器系など）SCC（子宮）
CA125（卵巣）CA19-9（膵臓や胆管など）

甲状腺 セット

3,300円

甲状腺異常（橋本病やバセドウ病）のスクリーニング
TSH・FT3・FT4

貧血 セット

2,200円

貧血に関連した検査項目セット
Fe・UIBC・フェリチン定量・網状赤血球

※単独の場合、診察料が別途発生します。 採血検査：3,800円/その他検査：1,100円



自 費 検 査

健康診断への追加
健診以外での、単独検査が可能です

HBs抗体・抗原
HCV抗体・梅毒

10,000円

B型肝炎・C型肝炎・梅毒の感染症チェック

HBs抗体・抗原
HCV抗体

6,000円

B型肝炎・C型肝炎の感染症チェック

梅毒

4,000円

TP抗体定性(過去の感染有無)
RPR法定性(活動性・治療効果)を検査

HBs抗原・抗体

各 2,200円

HBs抗原：感染の有無
HBs抗体：免疫の有無(ワクチン接種後など)

HCV抗体

2,200円

HCV抗体：感染の有無を検査

HIV抗原・抗体

3,300円

HIVの感染の有無をチェック

麻疹・風疹
水痘・おたふく

11,000円

抗体の有無を検査(ワクチン後の抗体価検査)
全てEIA法-IgGで検査

麻疹・風疹
水痘・おたふく
各 1項目

各 3,300円

左記の項目、1項目での検査

※単独の場合、診察料が別途発生します。

採血検査：3,800円/その他検査：1,100円



自 費 検 査

アレルギー 39項目

13,000円

の物質が、アレルギー反応を起こすか調べる検査

血液型(ABO/Rh)

2,200円

血液型と+・-を調べる検査

MCI スクリーニング+

22,000円

軽度認知障害(MCI)リスク検査
検査結果は、専用報告書でお渡しします

便 細菌5種

3,500円

シゲラ・腸チフス・パラチフス・サルモネラ菌・O-157
要便提出

便潜血 2日

2,200円

2日間便を採取し、潜血の有無を検査
要便提出

MRSA

5,000円

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の検査
咽頭・鼻ぬぐいで検体採取します

※単独の場合、診察料が別途発生します。 採血検査：3,800円/その他検査：1,100円



自費検査

尿検査 3項目

550円

潜血・蛋白・糖

尿検査 10項目

1,500円

潜血・たんぱく・糖・白血球・ウロビリノーゲン
ケトン体・亜硝酸塩・ビリルビン・Ph・尿比重

心電図

2,200円

心臓が動く際に発する電気信号を波形として記録する検査
不整脈や虚血性心疾患などを発見することができる

胸部レントゲン

2,200円

肺がんなどの呼吸器疾患の早期発見や心臓の大きさや
形の異常確認、胸郭や胸膜の異常発見など

視力

550円

ランドルト環を用いた視力検査

聴力

550円

オーディオメーターを用いた簡易聴力検査

※単独の場合、診察料が別途発生します。 採血検査：3,800円/その他検査：1,100円



脳ドック

おすすめのオプション

MCI スクリーニング+

22,000円

軽度認知障害(MCI)リスク検査(採血)
検査結果は、専用報告書でお渡しします


OMCIスクリーニング+検査に適しているご年齢：**40歳以上の方**

※アミロイドβ：認知症の原因の1つ

認知症発症の約20年前からアミロイドβの蓄積が始まると言われています。

アミロイドβの蓄積は、加齢・生活習慣が関与しています。

認知症予防には、自覚症状がない早い段階での検査・生活習慣改善が有効です。



予防が有効・推奨される期間

医療ケアが必要な期間

MCIスクリーニング+報告書サンプル

MMSE

3,000円

時間・場所の見当識,即時記憶,遅延再生,計算,言語能力,
図形描写など11項目を短時間(10~15分)で評価する

VS-RAD

7,500円

記憶に関わる海馬傍回,海馬,扁桃の萎縮度を検査
萎縮度からアルツハイマー型認知症の可能性を数値化